

癌症的致因，尚無法確知，而其預防之道，在於早期發現，早期診斷，及時治療。目前常見的婦女生殖系癌症有：子宮頸癌、子宮內膜癌、卵巢癌、陰道癌與陰唇癌等，其中威脅我國婦女心理和危害婦女生命最大的勁敵，可算是子宮頸癌，其特徵是經過子宮頸上皮病變才形成的，期間很長，但這些癌症皆可由病人的自覺症狀及平時對身體的關注，經由早期發覺、早期治療，得到完全的康復。

一、一般症狀

- (1)陰道分泌物：即所謂「白帶」。正常婦女的陰道本有分泌物存在，但如分泌過多，帶有異味或臭味時都應加以注意，尤其白帶中混合少許血絲，現即所謂「赤帶」更要謹慎，應找醫師檢查。
- (2)陰道異常出血：包括不規則的出血、性交後的出血、兩次經期間的出血、停經後的出血及劇烈運動後的出血。
- (3)疼痛：包括下腹痛及局部疼痛，這些可能是由於單純發炎所引起，或早期癌病合併發炎引起，也可能是癌症較晚期的症狀。



二、診斷方法

對於常見的婦女生殖系癌症，主要診斷方法有二：

- (1)細胞抹片檢查：
- (2)病理組織切片檢查：子宮頸癌的癌組織，首先是在粘膜上皮內發生的，不斷的增殖使腫瘤向四週發展，而穿破上皮下的基底膜，侵入皮下組織，更進而蔓延至其他器官，臨床上由侵犯的程度分為：
 1. 零期：也稱為原位癌，癌細胞侵犯在上皮內，尚未到基底膜侵犯真皮組織。從零期癌發展到一期，在台灣平均只有四年。
 2. 一期：癌細胞已穿過基底膜，但仍侷限在子宮頸內。
 3. 二期：癌細胞已穿過子宮頸，但尚未侵入陰道下三分之一處及骨盆壁。
 4. 三期：癌細胞已侵入陰道下三分之一處及骨盆壁。
 5. 四期：癌細胞已蔓延到膀胱及直腸，甚至發生遠端器官的轉移。

諮詢服務電話：(02)2683-6600

子宮頸癌

病歷號/姓名	指導日期	病患或家屬簽名	指導者簽名

三、治療：

癌症的治療越早，癌細胞的轉移性越小，可選擇的治療方法越多，根除機會越大。現將主要癌症治療方法介紹於下：

- (1)手術：開刀將患部摘除，適用於較早期的癌症，只要病人的一般身體狀況良好而無其他合併症時，均適行手術。
- (2)放射線治療：利用放射線對患部治療，適用於早期、晚期子宮頸癌病人，對於早期的子宮頸癌，放射療法與手術療法效果相似。如病人年齡太大，或屬晚期的癌症病人，則放射線治療較為可行。
- (3)化學療法：使用藥物治療，使癌細胞萎縮消失。這對於癌細胞已有轉移而無法做手術或放射線療法的病人，可以考慮此種療法。



諮詢服務電話:(02)2683-6600

子宮頸癌

病歷號/姓名	指導日期	病患或家屬簽名	指導者簽名